

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mme Justine Bellecrampe

Oroken 200mg (CEFIXIME)

1 comprimé matin et soir pendant 8 jours.

Signature du médecin

Nombre de produits :1

CTE infection urinaire 1

1)Recevabilité de l'ordonnance :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque :

Le +33 devant le numéro de téléphone, le pays, l'âge ou la date de naissance de la patiente.

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2)Analyse des spécialités :

DCI, dosage, forme galénique	Indication thérapeutique	Classe thérapeutique, liste	Mode d'emploi
Oroken, Céfixime, 200mg, comprimé	Infection urinaire basse en dehors des états infectieux sévères	Céphalosporine de 3 ^e génération Liste 1	A avaler avec un grand verre d'eau.

3)Analyse globale :

3.1) But thérapeutique :

Cette ordonnance traite une infection urinaire basse en dehors d'un état infectieux sévère.

3.2) Associations bénéfiques :

Il n'y en a aucune.

3.3) Interactions médicamenteuses :

Après contrôle et analyse de l'ordonnance, toutes les posologies sont correctes, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ni contre-indication absolue.

3.4) Conclusion :

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure.

4) Délivrance :

Céfixime 200mg : 2 boîtes de 8 comprimés.

5) Formalité + facturation :

Pour Céfixime 200mg, je note posologie et mode d'emploi sur les conditionnements.

6) Conseils pathologie :

Boire beaucoup d'eau : 1,5 à 2L par jour, avec des mictions complètes et régulières. Bien s'essuyer d'avant en arrière. Ne pas se retenir d'uriner. Ne pas laisser une constipation ou une diarrhée s'installer.

Ne pas porter de vêtements trop serrés, éviter les sous-vêtements synthétiques, éviter les savons avec des agents acides, préféré des savons de toilettes intimes respectant le ph intime (saforelle, hydralin...), faire une toilette intime 1 fois par jour, trop de toilettes intimes peut déséquilibrer la flore vaginale.

Un ECBU est fortement recommandé avant chaque traitement antibiotique afin de confirmer le diagnostic.

Ne pas hésiter à utiliser des plantes (busserole, queue de cerise...) qui ont un effet diurétique.

Eviter les aliments qui peuvent rendre les urines acides (citron, orange, pamplemousse...)

Une infection urinaire est signe d'une flore vaginale déséquilibré, il faudra utiliser un probiotique afin de la rééquilibrée et éviter les récurrences.

7) Conseils médicament :

A prendre avec un grand verre d'eau.

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mme Camille Albane

Monuril (FOSFOMYCINE)

1 sachet le soir

Movicol

1 sachet le matin pendant 10 jours

Normacol

1 prise en utilisation immédiate

Signature du médecin

Nombre de produits :3

CTE infection urinaire 2

1) Recevabilité de l'ordonnance :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque :

Le +33 devant le numéro de téléphone, le pays, l'âge ou la date de naissance de la patiente.

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2) Analyse des spécialités :

DCI, dosage, forme galénique	Indication thérapeutique	Classe thérapeutique, liste	Mode d'emploi
Monuril, Fosfomycine, 3g, sachet	Traitement de la cystite aiguë non compliquée	Fosfomycine Liste 1	A prendre en prise unique.
Movicol, Bicarbonate de sodium 178,5mg, macrogol 3350, 13,125g, potassium chlorure 46 ;6mg, sodium chlorure 350,7mg, sachet	Traitement symptomatique de la constipation chez l'adulte.	Laxatif osmotique Sans liste	Chaque sachet doit être mis en suspension dans un verre d'eau.
Normacol, phosphate	Traitement symptomatique	Laxatif de lest	1 lavement 5 à 20 minutes avant le

disodique 10,4g/130ml, phosphate monosodique 23,66g/130ml, lavement	de la constipation basse chez l'adulte	Sans liste	moment choisi pour l'exonération.
--	--	------------	---

3) Analyse globale :

3.1) But thérapeutique :

Cette ordonnance traite une infection urinaire et une constipation.

3.2) Associations bénéfiques :

Movicol - Normacol : traitement de fond et d'attaque de la constipation chez l'adulte.

Infection urinaire-movicol-normacol : lutte contre la constipation due à l'infection urinaire.

3.3) Interactions médicamenteuses :

Après contrôle et analyse de l'ordonnance, toutes les posologies sont correctes, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ni contre-indication absolue.

3.4) Conclusion :

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure.

4) Délivrance :

Fosfomycine 3g: 1 boîte de 1 sachet

Movicol : 1 boîte de 20 sachets

Normacol : 1 boîte de 1 lavement

5) Formalité + facturation :

Pour Fosfomycine 3g, je note posologie et mode d'emploi sur les conditionnements.

6) Conseils pathologie :

Boire beaucoup d'eau : 1,5 à 2L par jour, avec des mictions complètes et régulières. Bien s'essuyer d'avant en arrière. Ne pas se retenir d'uriner, lutter contre la constipation et la diarrhée.

Ne pas porter de vêtements trop serrés, éviter les sous-vêtements synthétiques, éviter les savons avec des agents acides, préféré des savons de toilettes intimes respectant le ph intime (saforelle, hydralin...), faire une toilette intime 1 fois par jour, trop de toilettes intimes peut déséquilibrer la flore vaginale.

Un ECBU est fortement recommandé avant chaque traitement antibiotique afin de confirmer le diagnostic.

Ne pas hésiter à utiliser des plantes (busserole, queue de cerise...) qui ont un effet diurétique.

Eviter les aliments qui peuvent rendre les urines acides (citron, orange, pamplemousse...)

Une infection urinaire est signe d'une flore vaginale déséquilibré, il faudra utiliser un probiotique afin de la rééquilibrée et éviter les récives.

Constipation :

Boire environ 1,5L à 2L d'eau par jour. (Eau hépar, + un verre de jus d'orange au réveil.)

Enrichir l'alimentation en fibres végétales, légumes verts, fruits, pain complet.

Eviter les apports farineux, féculent, légumes secs.

Pratiquer une activité douce (marche, natation..) pour faire travailler les abdominaux. Se présenter à la selle à heures régulières ou au moindre besoin spontané.

7) Conseils médicament :

Fosfomycine : à prendre à distance de minimum 2h du repas. Dans l'idéal, le sachet est à prendre le soir au coucher après être allé uriner, afin que l'antibiotique agisse toute la nuit (plus longtemps il agit, plus il sera efficace). S'il n'est pas possible d'attendre le soir, il est possible de prendre le sachet, mais on ne doit pas aller aux toilettes durant au moins 2h.

Movicol : les sachets sont à mettre en suspension dans un verre d'eau. Il est idéal de le prendre le matin, à jeun d'une petite demi-heure. Le médicament agit 24 à 48heures après l'administration.

Normacol : à administrer allongé sur le côté gauche avec les deux genoux pliés, bras au repos. Retirer le capuchon protecteur recouvrant la canule lubrifiée. Introduire doucement la canule dans l'orifice anal. Par pression régulière, appuyer sur le flacon jusqu'à expulsion du liquide. Cesser immédiatement l'administration en cas d'apparition d'une résistance. Ne pas forcer l'introduction car cela peut entraîner des lésions locales. Continuer d'effectuer une pression sur le flacon jusqu'à extraction complète de la canule, afin d'éviter un effet ventouse et que le liquide rentre dans le flacon. Essayer de garder le produit le plus longtemps possible avant d'aller à la selle.

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mme Candide Albicans

Gynopura LP 150 (Econazole LP 150)

Un ovule maintenant et un ovule dans 3 jours

Gynopura Crème (Econazole crème)

Une application matin et soir pendant 7 à 14 jours

Gynophilus

Une gélule intra vaginale par jour à la fin du traitement

Signature du médecin

Nombre de produits :3

CTE mycose vaginale

1) Recevabilité de l'ordonnance :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque :

Le +33 devant le numéro de téléphone, le pays, le sexe du patient.

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2) Analyse des spécialités :

DCI, dosage, forme galénique	Indication thérapeutique	Classe thérapeutique, liste	Mode d'emploi
Gynopura LP, Econazole LP, 150mg, ovule	Traitement local des mycoses du vagin et de la vulve, notamment des candidoses	Antifongique à large spectre, imidazolé Sans liste	Introduire l'ovule en position allongé pendant 5 à 10 minutes, de préférence le soir
Gynopura, Econazole, 1%, crème	Traitement local des mycoses du vagin et de la vulve, notamment des candidoses	Antifongique à large spectre, imidazolé Sans liste	Appliquer la crème, sur la partie externe, sur une peau propre et sèche
Gynophilus, gélule vaginale	Relai d'un traitement local antifongique	Probiotique lactobacillus Sans liste	Introduire la gélule vaginale en position allongée pendant 5 à 10 minutes, de préférence le soir

3) Analyse globale :

3.1) But thérapeutique :

Cette ordonnance traite une mycose vaginale, et un traitement probiotique en relai de la mycose afin d'éviter les récurrences.

3.2) Association bénéfique :

Econazole crème- éconazole ovule : traitement interne et externe de la mycose vaginale

Econazole crème- éconazole ovule-gynophilus : traitement d'attaque de la mycose vaginale, et traitement probiotique pour éviter les récurrences.

3.3) Interactions médicamenteuses :

Après contrôle et analyse de l'ordonnance, toutes les posologies sont correctes, il n'y a pas d'interactions médicamenteuses, ni contre-indications absolues.

3.4) Conclusion :

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure.

4) Délivrance :

Econazole LP 150mg : 2 boîtes de 1 ovule

Econazole crème : 1 tube de 30g

Gynophilus gélules vaginales : 1 boîte de 14 gélules.

5) Formalité+facturation :

Aucun médicament listé.

6) Conseils pathologies :

-lutter contre l'humidité, propice au développement des champignons : bien se sécher avant de mettre ses sous-vêtements, privilégier les culottes en coton qui absorbent mieux la transpiration, ne pas garder son maillot de bain après avoir nagé en piscine, éviter le port de vêtements trop serrés

-changer souvent les protections durant les règles, éviter les tampons

-éviter d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons, utiliser un savon respectant le ph de la flore vaginale (saforelle, hydralin...)

-suite à une mycose, rééquilibrer la flore avec des probiotiques.

7) Conseils médicaments :

Econazole ovule : Mouillé le bout de l'ovule afin de faciliter l'introduction de l'ovule. L'introduire en position allongé, de préférence au coucher, le plus profondément possible dans le vagin. L'ovule fond au contact de la muqueuse, ce qui peut provoquer des écoulements, il est conseillé d'utiliser une protection adaptée afin d'éviter ce désagrément. Ne pas interrompre le traitement en cas de règles.

Bien se laver les mains avant et après l'utilisation de l'ovule.

Econazole crème : A appliquer sur une peau propre et sèche, bien se laver les mains avant et après.

Gynophilus : Tout idem que l'éconazole ovule. Le traitement est a débuté après le traitement par éconazole. En cas de règle, débuté gynophilus après.

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr Bruce WAYNE

Metformine 1000 :

1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir

Diamicron 30 LM :

1 comprimé le matin

Coversyl 4mg :

1 comprimé le matin

Atorvastatine 10mg :

1 comprimé le soir

Levemir

10 unités le soir

Lancettes :

1 boîte

Bandelettes :

1 boîte

Lecteur de glycémie.

Signature du médecin

Nombre de produits :8

CTE Diabète :

1) RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque :

Le poids du patient et son âge.

Le +33 devant le numéro de téléphone, le pays.

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2) ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, D.C.I.	Liste et/ou législation	Classe pharmaco.	Indications	Conseils de prise ou emploi
Glucophage, metformine 1000mg, comprimé	Liste 1	Biguanide	Antidiabétique oral	A prendre au cours ou à la fin du repas
Diamicron, gliclazide 30mg libération modifiée, comprimé	Liste 1	Sulfamide hypoglycémiant	Antidiabétique oral	A prendre avant le repas
Coversyl, périndopril 4mg, comprimé	Liste 1	Inhibiteur de l'enzyme de	Antihypertenseur	A prendre le matin
Tahor,				

atorvastatine 10mg, comprimé		conversion		
Levemir, insuline, stylo injecteur.	Liste 1	Inhibiteur de la HMGcoa réductase	Hypolipémiant	A prendre le soir
	Liste 1	Insuline retard	Insuline d'action lente	Injection le soir

3) DISPOSITIFS MEDICAUX :

Le stylo :

Elles se positionnent dans le stylo.

Les lancettes Fastclix auto-piqueur servent à effectuer l'autocontrôle, les millimètres sont réglables sur le stylo et le nombre de test restant dans le barillet est affiché

Les lancettes :

Les boîtes de lancettes comportent 34 Barillets de 6 Lancettes, soit 204 lancettes, ce qui permet d'éviter les piqûres accidentelles.

Le barillet sécurisé est facilement repérable et non réutilisable.

Les lancettes sont invisibles avec un diamètre réduit pour moins de douleurs et d'appréhension.

Elles sont utilisées afin de pouvoir prélever un échantillon de sang.

On va positionner la lancette au niveau du site de prélèvement, de préférence sur le côté du doigt afin d'éviter des douleurs post-prélèvement et en évitant la pince préhension.

On maintient la lancette sur le site de prélèvement et on va exercer une pression ferme jusqu'à entendre un clic sonore confirmant l'activation automatique de la lancette.

On réalise ensuite le recueil de la goutte de sang formée.

Une fois les 6 tests utilisés il faudra jeter le barillet dans une boîte jaune DASTRI.

Les Bandelettes :

On utilisera les bandelettes ACCUCHECK Performa pour effectuer l'autocontrôle.

La boîte est constituée de 2 flacons de 50 bandelettes. Une fois ouvert, il est conseillé de l'utiliser dans les 3 mois.

Les bandelettes servent à déterminer la glycémie des patients diabétiques.

Elles servent à recueillir le sang qu'il soit capillaire ou veineux afin de déterminer le taux de glucose dans le sang.

La goutte formée à l'aide de l'auto-piqueur et de la lancette, est appliquée à proximité de la bandelette.

Lorsque la quantité de sang est suffisante un « bip » sonore se fait entendre, un sablier apparaît alors sur l'écran et la valeur de la glycémie s'affiche dans les 5 secondes.

La bandelette est à usage unique et se jette à chaque utilisation dans une boîte jaune DASTRI.

Le lecteur de Glycémie :

Il est prêt à l'emploi, dès son allumage il ne nécessite aucun réglage hormis la date et l'heure.

Des alertes sont programmables afin de rappeler de contrôler sa glycémie avant et après le repas.

Il dispose d'un grand écran pour lire facilement les mesures de glycémie, un grip antidérapant pour un meilleur confort, identification des glycémies pré et postprandiale, moyenne des glycémies pré et postprandiales, alerte de risque d'hypoglycémie, contrôle automatique de volume sanguin.

Il permet donc le contrôle de la glycémie d'une manière simple et rapide.

Avec des mains propres et sèches, on prendra une bandelette et on va l'insérer dans le lecteur.

Ensuite on prélève la goutte de sang et on la met en contact avec la bandelette. Le résultat s'affiche en 5 secondes.

On se lave ensuite les mains à l'eau savonneuse.

L'appareil se nettoie à l'alcool en évitant de toucher les pièces électroniques.

4) ANALYSE GLOBALE :

4.1) BUT THERAPEUTIQUE :

Le patient est atteint d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle et d'une hypercholestérolémie.

4.2) ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Lancettes, Bandelettes, lecteur : AB / mesure de la glycémie.

Glucophage, diamicon, Levemir : AB / Molécules d'actions différentes mais agissant dans le contrôle du diabète.

Tahor, Coversyl : contrôle du risque cardiovasculaire par réduction de l'hypertension artérielle et par diminution du risque de formation de plaques d'athérome.

Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse.

Il n'y a pas de contre-indication.

Les posologies sont bonnes.

4.3) DELIVRANCE :

Metformine 1000mg : 2 boites de 30 comprimés.

Diamicron 30mg LM : 1 boîte de 30 comprimés.

Coversyl 4mg : 1 boîte de 30 comprimés

Atorvastatine 10mg : 1 boîte de 30 comprimés

Levemir : 1 boîte

Bandelettes : 1 boîte de 100.

1 lecteur de glycémie.

5) FORMALITES de DELIVRANCE :

Pour Metformine, diamicron, coversyl, atorvastatine, Levemir, je note la posologie et le mode d'emploi sur le conditionnement.

6) CONSEILS AU PATIENT :

Metformine : L'effet secondaire principal est la diarrhée. Le fait de le prendre en mangeant diminue cet effet. Si cet effet secondaire persiste malgré la prise pendant le repas, il faudra consulter avant de changer la molécule.

Diamicron : A prendre au début du repas. Ce médicament est hypoglycémiant donc pas de prise en cas de repas sauté.

Coversyl : L'effet secondaire le plus fréquent est une toux sèche. Il faut consulter le médecin si ce symptôme persiste. En cas d'hypotension orthostatique on conseillera de prendre ce médicament le soir.

Atorvastatine : Prise le soir car la synthèse du cholestérol se fait le soir. Attention aux crampes, risque de rhabdomyolyse. Consulter si le symptôme persiste.

Levemir : Il faudra penser à changer de site d'injection à chaque fois (bras, ventre, cuisse, fesses).

Privilégier la cuisse et les fesses pour l'insuline retard. Conservation à température ambiante pendant l'utilisation, soit 3 à 4 semaines. En dehors de ça il faudra le conserver au frigo.

Conseils sur la pathologie :

Le diabète :

On est considéré comme diabétique quand la glycémie matinale est supérieure à 1,26g/l au moins à deux reprises ou une glycémie de 2g/l à deux reprises au cours de la journée.

Il faudra privilégier des repas équilibré et adapté à l'activité physique (et aux doses d'insuline s'il y en a).

3 repas apportant une ration suffisante en sucres lents. Les sucres rapides sont à éviter. Il faudra favoriser les glucides à index glycémique bas, réduire la consommation d'aliments gras et d'alcool.

Il faut augmenter la consommation de fibres, pratiquer une activité physique régulière, soin des pieds et de la peau.

Ne jamais arrêté le traitement s'il y a survenu d'effets secondaires, consulter le médecin.

Attention à l'automédication, effectuer les surveillances du diabétique par l'autocontrôle glycémique, dosage de l'hémoglobine glyquée, ECG du fond d'œil, vaccination contre la grippe, test de sensibilité, dosage de la créatine sanguine, albuminurie, doppler des membres inférieurs.

L'hypertension :

On parle d'hypertension lorsque la pression artérielle systolique est supérieure à 140mmhg et /ou la pression diastolique est supérieure à 90mmhg.

Ne jamais arrêter le traitement et s'il y a survenu d'effets secondaire, consulter le médecin.

Avoir une alimentation équilibrée, éviter le café, l'alcool, le thé, le tabac.

Contrôler régulièrement sa tension, pratiquer une activité physique régulière, réduire une éventuelle surcharge pondérale, attention à l'automédication, limiter le stress et le surmenage, ne pas manger de réglisse.

L'hypercholestérolémie :

Limiter la consommation d'aliments riches en graisses saturées et cholestérol, préférer les aliments riches en graisses insaturées (Omega 3, oméga 6) et fibres (fruits, légumes, céréales...)

Arrêt du tabac, diminuer la consommation d'alcool, pratiquer une activité physique régulière.

La détection du Diabétique au comptoir :

Un homme se présente au comptoir et présente ces symptômes :

-Depuis un moment, il a une peau sèche avec une difficulté de cicatrisation.

-Une diminution de la sensibilité.

En discutant un peu plus, il dit qu'il se sent également fatigué, à faim et soif tout au long de la journée.

Par ailleurs il va beaucoup plus souvent aux toilettes.

Enfin on remarque chez ce patient une surcharge pondérale.





Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr. Barry Allen

Kenzen 4mg comprimé (CANDESARTAN 4mg)

1 cp par jour

Cardensiel 2,5mg (BISOPROLOL 2,5mg)

1 cp par jour

Levothyrox 75ug

1 cp tous les 2 jours en alternance

Levothyrox 100ug

1cp tous les 2 jours en alternance

Signature du médecin

Nombre de produits :4

CTE Hypothyroïdie

1) Recevabilité de l'ordonnance :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque :

Le +33 devant le numéro de téléphone, le pays, l'âge ou la date de naissance du patient.

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2) Analyse des spécialités :

<u>DCI, dosage, forme galénique</u>	<u>Indication thérapeutique</u>	<u>Classe thérapeutique</u>	<u>Mode d'emploi</u>
Kenzen, Candésartan, 8mg, comprimé	Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez l'adulte	Antihypertenseur, antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II	À prendre en une seule prise par jour, avec un grand verre d'eau, de préférence à la même heure
Cardensiel, Bisoprolol, 2,5mg, Comprimé	Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique	Bétabloquant	A prendre le matin, avec un grand verre d'eau.
Levothyrox, Levothyroxine sodique, 75ug, comprimé	Traitement de l'hypothyroïdie	Hormone thyroïdienne de synthèse	A prendre le matin à jeun d'une demi-heure avant le déjeuner.
Levothyrox,	Traitement de	Hormone	A prendre le

Levothyroxine sodique, 100ug, comprimé	l'hypothyroïdie	thyroïdienne de synthèse	matin à jeun d'une demi-heure avant le déjeuner.
--	-----------------	--------------------------	--

3) Analyse globale :

3.1) But thérapeutique :

Cette ordonnance traite une hypothyroïdie avec des troubles du rythme cardiaque (effet secondaire de l'hypothyroïdie)

3.2) Associations bénéfiques :

Levothyrox 75 et Levothyrox 100 : traitement de l'hypothyroïdie avec 2 dosages différents afin d'avoir un meilleur équilibre de la LT4.

Levothyrox 75 et 100 et bisoprolol : traitement de l'effet secondaire de l'hypothyroïdie (trouble du rythme cardiaque)

Levothyrox 75 et 100 et candesartan : traitement de l'effet secondaire de l'hypothyroïdie (trouble du rythme cardiaque)

3.3) Interactions médicamenteuses :

Après contrôle et analyse de l'ordonnance, toutes les posologies sont correctes, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ni contre-indication absolue.

Conclusion :

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure.

3.4) Délivrance :

Candésartan 8mg : 1 boîte de 90 comprimés

Bisoprolol 2,5mg : 1 boîte de 90 comprimés

Levothyrox 75mg : 1 boîte de 30 comprimés

Levothyrox 100 mg : 1 boîte de 30 comprimés.

4) Formalité + facturation :

Pour Candésartan 8mg, Bisoprolol 2,5mg, Levothyrox 75mg et 100mg, je note posologie et mode d'emploi sur les conditionnements.

5) Conseils :

5.1) Pathologies :

Hypothyroïdie :

- Pratiquer une activité physique régulière
- Trouver le dosage en levothyrox peut s'avérer compliqué, si certains symptômes persistent ou reviennent, consulter un médecin afin de rééquilibrer le dosage
- Avoir un régime alimentaire équilibré : apport suffisant en fibre, protéines maigres, graisses saines, s'hydrater suffisamment.
- Éviter l'alcool et le tabac, avoir un bon apport en sommeil

Hypertension artérielle :

- Manger équilibré (apport suffisant en fibre, graisses saines, protéines maigres, fruits et légumes)
- Mesurer fréquemment sa tension. Si des symptômes réapparaissent, ou que la tension est anormale, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin ou votre pharmacien.

- Réduire la consommation en sel
- Eviter l'alcool et le tabac, avoir un bon apport en sommeil
- Pratiquer une activité physique régulière

Insuffisance cardiaque :

- Cf. conseils hypertension artérielle.

5.2) Conseil médicaments :

Bisoprolol :

- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis médical.
- Porter une carte sur vous, qui précise quel traitement et quel dosage vous prenez.
- Prévenir chaque professionnel de santé du traitement que vous prenez.
- Prendre le traitement à heure régulière.
- Ne pas prendre deux comprimés pour compenser un oubli.

Candésartan :

- Cf. bisoprolol.

Levothyrox :

- Prendre le matin à jeun d'une demi-heure avant le repas
- Si tout effet secondaire se fait ressentir, ou si le dosage ne se sent plus efficace, consulter un médecin.

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

DERMATOLOGUE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr James PUSTUL

Tolexine 100mg : 1cp par jour pendant 3 mois

A prendre au cours d'un repas avec un verre d'eau.

(Attention : Stop au soleil)

Puis, si besoin passer à

Rubozinc

2 ge par jour pendant 3 à 6 mois

A prendre à distance des repas avec un verre d'eau

Localement, appliquer le soir, sur les zones à problèmes :

Crème DIFFERINE

En alternance un soir sur deux avec

Crème Cutacnyl 2,5 voire 5 (Attention : Stop si soleil sur les zones traitées)

En cas de bouton inflammatoire, appliquer ponctuellement

Lotion ERYFLUID 1 à 2 fois/jour

Le matin, en guise de crème de jour

Crème KERACNYL PP (DUCRAY)

Traitement local à renouveler pour 6 mois.

Signature du médecin

Nombre de produits :6

CTE L'acné

1) RECEVABILITE :

Cette ordonnance n'est pas recevable, il manque :

Le mail du prescripteur, le pays, le +33 du n° de tel

L'âge du patient et éventuellement son poids.

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2) ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, D.C.I.	Liste et/ou législation	Classe pharmaco.	Indications	Conseils de prise ou emploi
Tolexine, 100mg, doxycycline, comprimé	Liste 1	Antibiotique, cycline.	Traitement de l'acné	A prendre en mangeant, ne pas se coucher pendant 30 minutes à 1 heure.
Rubozinc, 15mg, Zinc, gélule.	Non listé	Anti acnéique général	Traitement de l'acné inflammatoire	A prendre à distance d'environ 2 heures du repas. A appliquer le soir.
Différine, 0,1%, adapalène, crème.	Liste 1	Anti acnéique local	Traitement de l'acné sévère à moyenne	

Cutacnyl,2,5%, Peroxyde de benzoyle, crème.	Liste 2	Anti acnéique local	Traitement de l'acné vulgaire	A appliquer le soir.
Eryfluid, Erythromycine, lotion.	Liste 1	Antibiotique local, action antibactérienne.	Traitement local de l'acné	A appliquer sur les boutons inflammatoires.

3) DISPOSITIFS MEDICAUX :

Crème Keracnyl PP

C'est une crème apaisante anti-imperfections.

Elle aide à réduire les imperfections, réduit les boutons enflammés, prévient l'apparition de marques résiduelles, apaise les irritations et aide à réduire l'excès de sébum.

Elle est à appliquer le matin et le soir sur l'ensemble du visage.

C'est une excellente base de maquillage, utilisation possible avec différents traitements médicamenteux.

En terme d'entretien il faudra nettoyer l'embout après chaque utilisation, attention à la date d'ouverture de la crème afin de respecter le délai d'ouverture jusqu'à la date de péremption.

4) ANALYSE GLOBALE :

4.1) BUT THERAPEUTIQUE :

Cette ordonnance est destinée au traitement de l'acné inflammatoire.

4.2) ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE

ANORMALE :

Différine, Cutacnyl, Eryfluid : AB / Tous ses traitements agissent avec des cibles d'actions différentes mais participent au traitement de l'acné inflammatoire

Différine, Cutacnyl, Tolexine, Keracnyl PP : AB / Traitement local et oral de l'acné.

Après contrôle et analyse de l'ordonnance, toutes les posologies sont correctes, il n'y a pas d'interactions médicamenteuses ni de contre-indication absolue.

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure empêchant la délivrance.

4.3) DELIVRANCE :

Tolexine 100mg : 1 boîte de 28 cp

Adapalène 0,1% : 1 tube de 30g

Cutacnyl 2,5% : 1 tube de 40g

Eryfluid lotion : 1 flacon de 30ml

Keracnyl PP : 1 boîte de 30g

Rubozinc : 1 boîte de 60 gélules qui ne sera délivré si la tolexine est mal tolérée ou bien s'il y a contre-indication à l'utilisation (période estivale, départ au soleil).

5) FORMALITES de DELIVRANCE :

Pour les médicaments Tolexine, Différine, Cutacnyl, Eryfluid ou Rubozinc je note la posologie et le mode d'emploi sur les différents conditionnements.

Un rappel de la contre-indication au soleil est rappelé sur les conditionnements de la Tolexine et le Cutacnyl.

6) CONSEILS AU PATIENT :

Tolexine : A prendre en mangeant et ne pas se coucher pendant 30' à 1 heure après la prise. Si petite exposition solaire (hiver), se protéger la peau avec un écran total.

En été, et en accord avec le médecin on préfère utiliser le Rubozinc et arrêter la Tolexine qui est photo sensibilisant.

Rubozinc : A prendre à distance des repas (2 heures).

A prendre en position assise et ne pas s'allonger pendant 30 minutes suivant la prise.

Différine : Après avoir bien laver et sécher la peau, appliquer une noix de crème sur les lésions acnéiques en évitant le contour des yeux et des lèvres, au coucher.

Les résultats sont visibles après 4 à 8 semaines de traitement. En cas d'exposition même minime de la peau au soleil, utiliser un écran total.

Si une exposition prolongée au soleil est prévue, ne pas appliquer la crème la veille, le jour même et le lendemain.

Si une brulure est apparue, ne plus utiliser la crème jusqu'à rétablissement complet.

Cutacnyl : Après avoir laver et sécher la peau, appliquer la crème sur l'ensemble des zones touchées en fine couche, jusqu'à pénétration complète du produit.

Mêmes recommandations pour le soleil et la peau lésée que la différine.

Attention aux vêtements et cheveux car ce produit peut les décolorer.

En raison d'un risque important d'irritation, tester la sensibilité de la peau en début de traitement avec une touche d'essai (Une petite application répétées sur la même zone pendant 10 à 15 jours).

Si apparition d'œdème, arrêter le traitement et revoir le médecin.

Eryfluid : Après avoir laver et sécher la peau, appliquer la lotion sur les lésions à l'aide d'un coton.

A utiliser jusqu'à disparition du bouton traité ce qui signifiera la disparition totale du germe à l'origine de l'inflammation et évitera la sélection de mutants résistants.

Il ne faudra pas manipuler les lésions car cela peut favoriser l'apparition de taches brunes et de cicatrices.

Ne pas s'exposer au soleil, qui provoque une amélioration relative et transitoire de la peau mais qui entraîne au long cours une aggravation de l'acné avec la création d'un effet rebond important.

En cas de soleil, utiliser un produit solaire spécifique à la peau acnéique.

Proscrire l'utilisation de produits décapants comme le savon de Marseille, les solutions alcoolisées.

Eviter les cosmétiques gras comédogènes non adaptés, attention au maquillage.

Nettoyer le visage et le corps en douceur avec des solutions micellaires sans rinçage, des nettoyants moussants sans savon en terminant par une pulvérisation d'eau thermale apaisante et éponger délicatement.

7) L'ACNE AU COMPTOIR :

Les limites du conseil seront une acné important !!

Une adolescente se présente avec une acné modérée.

Nettoyer le visage matin et soir à l'aide d'un produit adapté aux peaux acnéiques : pain dermatologique (Uriage Hyséac) ou un gel moussant (Effaclar gel moussant, Cleanance, Sébium...) ou une lotion sans rinçage (Sébium H2O, Keracnyl lotion purifiante...).

Eviter les laits 2 en 1, les laits de toilette pour bébé, savon de Marseille, lotions alcoolisées.

Une à deux fois par semaine, éliminer les impuretés à l'aide d'un exfoliant (Avène gommage doux purifiant, Exfoliac gel désincrustant...).

Le matin, hydrater à l'aide de formules non comédogènes (Sébiüm mat, Effaclar mat, Cleanance mat...).

Le soir, traiter les lésions avec un soin kératorégulateur et antibactérien (Hyséac 3-Régul Soïn global, Cleanance Expert soin, Keracnyl PP, Effaclar Duo+...).

Eviter le soleil, il améliore l'acné dans un premier temps mais provoque un épaissement de la couche cornée, responsable d'une flambée de boutons un mois plus tard. Choisir un photo protecteur adapté aux peaux acnéïques (Anthélios AC, Photoderm AKN mat...).



Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr. Jay Garric

Nicopatchlib 21mg/24h

Dispositif transdermique 1 patch par jour

Nicopass 1,5mg pastilles

4 à 6 selon besoin

Signature du médecin

Nombre de produits :2

CTE sevrage nicotinique

1) Recevabilité de l'ordonnance :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque :

Le +33 devant le numéro de téléphone, le pays, l'âge ou la date de naissance du patient.

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2) Analyse des spécialités :

<u>DCI, dosage, forme galénique</u>	<u>Indication thérapeutique</u>	<u>Classe thérapeutique</u>	<u>Mode d'emploi</u>
Nicopatchlib, nicotine, 21mg/24h, dispositif transdermique	Traitement du sevrage nicotinique	Substitut nicotinique	1 dispositif/jour. Ne jamais poser un patch au même endroit que les jours précédents
Nicopass, nicotine, 1,5mg, pastille	Traitement du sevrage nicotinique	Substitut nicotinique	Ne pas croquer, sucer et faire glisser sur les joues.

3) Analyse globale :

3.1) But thérapeutique :

Cette ordonnance traite un sevrage nicotinique.

3.2) Associations bénéfiques :

Nicopatch-nicopass : un traitement de fond avec un apport en nicotine sur 24h (nicopatch) et des gommes à sucer si l'envie se fait ressentir en journée (nicopass).

3.3) Interactions médicamenteuses :

Après contrôle et analyse de l'ordonnance, toutes les posologies sont correctes, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ni contre-indication absolue.

Conclusion :

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure.

3.4) Délivrance :

Nicopatchlib 21mg/24H : 1 boîte de 28 dispositifs

Nicopass 1,5mg : 3 boîtes de 96 pastilles.

4) Formalité + facturation :

Pour (les médicaments listés) je note posologie et mode d'emploi sur les conditionnements.

5) Conseils :

5.1) Pathologies :

Sevrage tabagique :

Suivre la méthode CREA :

C COMME CHANGER

Voici quelques exemples : si vous aviez l'habitude de commencer par prendre votre petit-déjeuner avant de vous laver, commencez maintenant votre journée en prenant votre douche avant le petit-déjeuner ; si vous aviez l'habitude de fumer chez vous à certains endroits précis, changez les meubles, le téléphone de place ; si vous aviez l'habitude de fumer à table dès la fin du dîner, commencez par débarrasser la table...

R COMME REMPLACER

Quand vous fumiez, la cigarette vous donnait peut-être l'impression de vous aider à vous calmer, vous donner une contenance, vous concentrer... L'arrêt du tabac peut alors donner l'impression d'un vide car fumer prend du temps. « Remplacer » par des activités ce temps pendant lequel vous fumiez.

E COMME ÉVITER

Il y a des situations particulièrement « à risque » : soirées entre amis, pause avec les collègues, café après le repas... Au début du sevrage, mieux vaut les éviter

temporairement. Mais ne vous éloignez pas de vos amis pour autant ; s'assurer de leur soutien est important. Pour vous encourager, dites-vous que ces précautions ne dureront qu'un temps limité et qu'une fois votre arrêt du tabac plus installé, vous aurez suffisamment confiance en vous pour affronter ces situations sans céder à la cigarette.

A POUR ANTICIPER

Annoncez à vos amis fumeurs que vous ne fumez plus et que vous avez besoin de leur soutien (par exemple, demandez-leur de ne pas fumer devant vous). Préparez des phrases clés pour contrer efficacement les éventuelles propositions de cigarettes.

Ne pas se sentir coupable d'avoir "craquer" : l'arrêt du tabac peut être un chemin difficile, craquer peut arriver, l'important est de continuer efficacement l'arrêt.

5.2) Conseil médicaments :

Nicopatchlib :

En mettre 1 par jour. Ne pas poser de dispositifs au même endroit que les jours précédents.

A poser sur les zones : bras, bas du dos, cuisse, fesses. (Zones non pileuses)

Il est possible de garder le dispositif la nuit. Si vous savez que la nuit vous ne ressentez pas l'envie de fumer, il n'est pas nécessaire de le garder. Si vous le mettez la nuit mais que des cauchemars arrivent, ne pas le mettre la nuit.

Si des nausées apparaissent dans la journée, mettre le dispositif sur la voute plantaire.

Nicopass :

A utiliser si une envie de fumer se fait ressentir malgré le patch (ou à utiliser seul sans le patch).

La gomme ne se mâche pas, il est à faire glisser sur les parois des joues afin que le médicament se diffuse.

Une gomme équivaut à une cigarette environ.

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

CARDIOLOGUE

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr Anthony Starck

Prescription relative au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste
ou hors liste)

Affection exonérante

- Twicor 10/10 mg : 1 cp le soir
- Duoplavin 75mg/75 mg : 1 cp le soir
- Natispray 0,15mg : 1 pulvérisation à la demande si douleurs thoraciques,
en appelant le 15 si persistance des douleurs.

Prescription sans rapport avec l'affection de longue durée

(Maladies intercurrentes)

QSP 6 mois

Signature du médecin

Nombre de produits :3

CTE Cholestérol :

1) RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable car il manque :

Le mail, le pays d'exercice du prescripteur.

L'âge du patient.

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2) ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, D.C.I.	Liste et/ou législation	Classe pharmaco.	Indications	Conseils de prise ou emploi
Twicor, ezetimibe 10mg/ Rosuvastatine 10mg, comprimé	Liste 1	Hypolipémiant, inhibiteur de l'HMG coA réductase	Traitement de l'hypercholestérolémie	A prendre au même moment de la journée avec un grand verre d'eau
Duoplavin, acide acétylsalicylique 75mg/ Clopidogrel 75mg, comprimé	Liste 1	Anti thrombotique, antiagrégant plaquettaire	Prévention secondaire lié à une athérombose	A prendre avec un grand verre d'eau
Natispray, trinitrine, 0,15mg, solution pour pulvérisation buccale	Liste 1	Dérivé nitré d'action rapide	Traitement préventif et curatif de la crise d'angor	Une pulvérisation à renouveler une fois si nécessaire.

--	--	--	--	--

3) DISPOSITIFS MEDICAUX :

4) ANALYSE GLOBALE :

4.1) BUT THERAPEUTIQUE :

Cette ordonnance réalise le traitement pour un patient ayant eu un accident d'athérombose. Traité par le Duoplavin en association avec du Twicor pour de l'hypercholestérolémie.

Le natispray servant au traitement d'éventuelles crises d'Angor.

4.2) ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Twicor-Duoplavin : AB / Les deux en association évitent les plaques d'athéromes.

Twicor-Duoplavin-Natispray : AB / Traitement de fond évitant la crise, et le natispray participe au traitement de la crise d'angor.

Twicor: AB / Deux molécules associées permettant de lutter contre l'hypercholestérolémie.

Duoplavin : AB / Deux molécules associées permettant d'améliorer la fluidité du sang et donc éviter la formation de caillots de sang dans les artères.

Après contrôle et analyse de l'ordonnance, toutes les posologies sont correctes, pas d'interactions médicamenteuses ni de contre-indications absolues.

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure et peut donc être délivrée.

4.3) DELIVRANCE :

Twicor 10/10mg : Une boîte de 90 comprimés

Duoplavin 75/75mg : Une boîte de 30 comprimés

Natispray 0,15mg : Une boîte de 200 doses.

5) FORMALITES de DELIVRANCE :

Pour les médicaments Twicor, Duoplavin, Natispray, je note la posologie et le mode d'emploi sur les conditionnements.

6) CONSEILS AU PATIENT :

Twicor : A prendre une fois par jour à heure régulière avec un grand verre d'eau, pendant ou en dehors des repas.

A prendre en complément d'un régime alimentaire adapté.

Duoplavin : Une prise par jour à heure fixe, pendant ou en dehors du repas avec un grand verre d'eau.

Attention à l'automédication, notamment avec les AINS.

Il convient de prévenir tout professionnel de santé de la prise de ce médicament.

Faire attention à tout signe de surdosage (gingivorragie, épistaxis, bleus inexpliqués...) dans ce cas consulter un médecin rapidement.

Attention aux conduites à risque (jardinage, cuisine...) où il y a risque de coupures et donc hémorragie.

Surveiller également des signes de troubles gastro-intestinaux.

Natispray : En cas de crise, une pulvérisation sublinguale, à renouveler au bout de deux à trois minutes si nécessaire.

S'asseoir et le rester pendant au moins une dizaine de minutes

Si la douleur ne passe pas après le renouvellement de la prise, appeler le 15.

Il faut penser à toujours le conserver dans sa poche.

La consommation d'aliments gras (charcuteries, fritures, sucreries...) doit être fortement limitée.

Consommation de viandes maigres (volaille, poisson non gras...).

Augmenter la consommation de fibres, pain, céréales, féculents.

Arrêt du beurre, on préfère la margarine.

Pour la cuisson, on utilisera plutôt de l'huile d'olive, de noix, de tournesol, de pépin de raisin ou de colza.

Pour les produits laitiers, préférer les yaourts et fromage 0%.

Eviter le tabac, l'alcool, pratiquer une activité physique régulière.

Réduire l'apport en sel et faire contrôler régulièrement son cholestérol.

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr. Tim Drake

Desloratadine 5mg cp

(AERIUS 5mg Cpr pell 2Plq/15 (30))

1 boîte Renouveler 2 fois

Prendre 1 comprimé par jour, pendant 1 mois

Beclométasone dipropionate 200ug/dose + formoterol fumarate 6ug/dose sol p
inhal en fl press

(INNOVAIR 200/6 ug/dose S inh en flacon pressurisé Fl/120 doses)

3 boîtes

Prendre 2 inhalations le matin et le soir, pendant 3 mois

Salbutamol (sulfate) 100ug susp p inhal en fl press

(VENTOLONE 100ug Susp inh Fl/200d)

1 boîte Renouveler 2 fois

2 bouffées si respiration sifflante ou toux incessante. A renouveler après 3-4 minutes si besoin

Maximum 10 bouffées en 15 mn

Signature du médecin

Nombre de produits :3

CTE asthme

1)Recevabilité de l'ordonnance :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque :

Le +33 devant le numéro de téléphone, le pays, le sexe du patient

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2)Analyse des spécialités :

<u>DCI, dosage, forme galénique</u>	<u>Indication thérapeutique</u>	<u>Classe thérapeutique</u>	<u>Mode d'emploi</u>
Aerius, Desloratadine, 5mg, comprimé	Traitement de l'allergie.	Anti allergique oral, Antihistaminique H1 Liste II	1 comprimé par jour, plutôt le soir.
Innovair 200/6 ug, beclometasone dipropionate 200ug + formoterol fumarate 6ug, suspension pour inhalation	Traitement de fond de l'asthme	Corticoïdes associés aux B2 stimulants de longue durée d'action Liste I	Ne jamais arrêter le traitement, se rincer la bouche et boire un verre d'eau ensuite.
Ventoline, Salbutamol, 100ug, poudre pour inhalation	Traitement de la crise d'asthme	Bronchodilatateur , B2 stimulant de courte durée d'action	À prendre si le besoin s'en fait ressentir (si crise)

		Liste I	
--	--	---------	--

3)Analyse globale :

3.1) But thérapeutique :

Cette ordonnance traite un patient asthmatique

Associations bénéfiques :

Innovair : un B2 stimulant est présent afin de dilater les bronches, et que le corticoïde puisse avoir une meilleure action

Innovair-ventoline : traitement de fond de l'asthme, plus un traitement de crise si besoin

Innovair-ventoline-aerius : traitement de l'asthme avec un antihistaminique pour éviter que les allergènes ne provoquent une crise.

3.2) Interactions médicamenteuses :

Après contrôle et analyse de l'ordonnance, toutes les posologies sont correctes, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ni contre-indication absolue.

3.3) Conclusion :

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure.

3.4) Délivrance :

Desloratadine 5mg : 1 boîte de 30 comprimés

Innovair 200/6ug : 1 flacon de 120 doses

Ventoline : 1 flacon de 200 doses

4)Formalité + facturation :

Pour Desloratadine, Innovair et Ventoline, je note posologie et mode d'emploi sur les conditionnements.

5)Conseils :

5.1) Pathologies :

Asthme :

- Boire des jus d'agrumes : la vitamine c a une action antihistaminique naturel.
- Expliquer la différence entre traitement de fond et traitement de crise et l'importance de l'observance du traitement de fond
- Aérer les pièces et la literie quotidiennement au moins 15min par jour
- Eviter la moquette et les tapis, meuble capitonné, papier peint...
- Lutter contre les acariens
- Eviter le tabac
- Pratiquer une activité physique régulière adaptée
- Eliminer les moisissures

5.2) Conseil médicaments :

Aerius : la prise se fait une fois par jour, en dehors ou au milieu du repas.

A prendre de préférence le soir car il y a un léger effet de somnolence, il faut donc faire attention à la conduite automobile, et ne pas associer d'alcool pour ne pas majorer l'effet sédatif. Ne pas arrêter le traitement afin qu'il soit le plus efficace possible. Si même sous aerius des signes d'allergies persistent ou réapparaissent, consulter votre médecin.

Innovair : La coordination main/bouche est indispensable. Si cette coordination s'avère difficile, préférer le dispositif nexthaler. Après chaque utilisation, se rincer la bouche, boire un verre d'eau, et nettoyer l'embout afin d'éviter toute mycose buccale ou raucité de la voix.

Ventoline : ne pas dépasser les doses prescrites. Si des difficultés respiratoires se font toujours ressentir, consulter votre médecin. Le salbutamol peut être cariogène, il est conseillé de se rincer la bouche voir même de se laver les dents après. Le faire au moins matin et soir va limiter le risque.

Au moment de l'utilisation, bien vider ses poumons avant, la prise de salbutamol n'en sera que plus efficace.

La coordination main/bouche est indispensable, si elle est difficile, préférer une chambre d'inhalation ou un autre dispositif (airomir ou novolizer par exemple).

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen
Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Me Diana PRINCE

Desloratadine 5mg Cp

Prendre 1 comprimé par jour, pendant 6 mois en systématique

Levocabastine (chlorhydrate) 0,05% collyre sol récip unidose

1 goutte/œil *2-4/j si besoin

QSP 6 mois

Mometasone furoate 50ug/dose susp p pulv nasal

Faire 1 pulverisation par jour, pendant 6 mois si besoin

Salbutamol (sulfate) 100ug pdre p inhal

2 à 4 inh*3-4/j si besoin

2 inh avt sport si besoin

QSP 6 mois

Signature du médecin

Nombre de produits :4

CTE rhinite allergique

1)Recevabilité de l'ordonnance :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque :

Le +33 devant le numéro de téléphone, le pays.

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2)Analyse des dispositifs :


Novolizer :

Description : le novolizer à un capuchon protecteur, un bouton rouge afin d'armer une dose, un compteur de dose, et une cartouche. Il suffit de changer de cartouche à chaque fois, mais on peut garder le même dispositif.

Indication : Dispositif pour une prise plus facile de salbutamol.

Utilisation : Enlever le capuchon protecteur, agiter avant chaque emploi. Le dispositif doit être enclencher en appuyant sur un bouton rouge, une lumière verte apparaitra, ce qui confirme que la dose est bien enclenchée. Bien vider les poumons, inspirer pour prendre la dose. Si la dose a été correctement prise, le voyant deviendra rouge.

Entretien : nettoyer l'embout après chaque utilisation. Le dispositif se change tous les ans.



3)Analyse des spécialités :

<u>DCI, dosage, forme galénique</u>	<u>Indication thérapeutique</u>	<u>Classe thérapeutique</u>	<u>Mode d'emploi</u>
Aerius,	Traitement de	Anti allergique	1 comprimé par

Desloratadine, 5mg, comprimé	l'allergie.	oral, Antihistaminique H1 Liste II	jour, plutôt le soir.
Levofree, Levocabastine chlorhydrate, 0,05%, collyre	Traitement de la conjonctivite allergique	Anti allergique local, Antihistaminique H1 Liste II	A utiliser si besoin, jeter l'unidose après chaque utilisation.
Nasonex, Mométasone, 50ug, suspension pour pulvérisation nasale	Traitement de la rhinite allergique	Antihistaminique et anti inflammatoire, corticoïde Liste I	1 pulvérisation par jour, plutôt après un lavage de nez
Ventilastin novolizer, Salbutamol, 100ug, poudre pour inhalation	Traitement de l'asthme	Bronchodilatateur béta 2 stimulant d'action brève Liste I	1 inhalation si gêne respiratoire

4)Analyse globale :

4.1) But thérapeutique :

Cette ordonnance traite d'une rhinite allergique

4.2) Associations bénéfiques :

Nasonex- ventilastin : traitement de la rhinite allergique avec un spray nasal et traitement des difficultés respiratoires du a la rhinite allergique avec du salbutamol (double action sur la difficulté respiratoire)

Aerius-ventilastin : traitement de fond de la rhinite allergique et traitement symptomatique des difficultés respiratoires dû à la rhinite allergique

Levofree- nasonex : traitement symptomatique des écoulements et/ou démangeaisons dues à la rhinite allergique

4.3) Interactions médicamenteuses :

Après contrôle et analyse de l'ordonnance, toutes les posologies sont correctes, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ni contre-indication absolue.

4.4) Conclusion :

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure.

4.5) Délivrance :

Desloratadine 5mg : 1 boîte de 30 comprimés

Levofree 0,05% : 4 boîtes de 30 unidoses

Nasonex 50ug : 1 flacon de 140 doses

Ventilastin novolizer 100ug : 1 dispositif de 200 doses

5) Formalité + facturation :

Pour Desloratadine, Levofree, Mometasone et Ventilastin novolizer, je note posologie et mode d'emploi sur les conditionnements.

6) Conseils :

6.1) Pathologies :

Rhinite allergique :

- Boire des jus d'agrumes : la vitamine c a une action antihistaminique naturel.
- Faire des lavages de nez à base d'eau de mer isotonique (2 fois par jour minimum)

- Se brosser les cheveux le soir afin de retirer tout allergène des cheveux, préféré également une douche le soir.
- En homéopathie, on peut également utiliser le Rhinallergy (sans dépasser 6 comprimés par jour)
- Portez des lunettes de soleil en extérieur ou lors du jardinage
- Fermez les fenêtres les jours de vent ou de concentration importante dans l'air
- Evitez la pratique de sport en extérieur pendant les fortes pollinisations
- Ne faites pas sécher le linge en extérieur
- Roulez les vitres fermées en voiture et changer régulièrement les filtres.

5.2) Conseil médicaments :

Aerius : la prise se fait une fois par jour, en dehors ou au milieu du repas.

A prendre de préférence le soir car il y a un léger effet de somnolence, il faut donc faire attention à la conduite automobile, et ne pas associer d'alcool pour ne pas majorer l'effet sédatif. Ne pas arrêter le traitement afin qu'il soit le plus efficace possible. Si même sous aerius des signes d'allergies persistent ou réapparaissent, consulter votre médecin.

Levofree : préféré nettoyer l'œil avec du sérum physiologique avant toute utilisation de Levofree. Nettoyer le surplus avec une compresse, que l'on va utiliser de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil afin d'éviter toute réintroduction d'allergène. Attendre environ 10 minutes entre chaque collyre afin qu'il se mélange efficacement à l'œil.

Nasonex : préféré effectuer un lavage de nez avant toute utilisation du Nasonex. Le lavage de nez retirera efficacement les allergènes, il faut ensuite se moucher le nez. Le nasonex lui aura le rôle de l'anti-inflammatoire et va décongestionner le nez.

Ventilastin : ne pas dépasser les doses prescrites. Si des difficultés respiratoires se font toujours ressentir, consulter votre médecin. Le salbutamol peut être cariogène, il est conseillé de se rincer la bouche voir même de se laver les dents après. Le faire au moins matin et soir va limiter le risque.

Au moment de l'utilisation, bien vider ses poumons avant, la prise de salbutamol n'en sera que plus efficace.

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr. Barry Allen

VALACICLOVIR 500mg cp

1 comprimé matin et soir pendant 5 jours

ACICLOVIR 5% crème

En application locale quatre fois par jour pendant 5 jours

ACICLOVIR 3% pom opht

En application locale quatre fois par jours pendant 5 jours

Signature du médecin

Nombre de produits :3

CTE Herpès

1)Recevabilité de l'ordonnance :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque :

Le +33 devant le numéro de téléphone, le pays, le sexe du patient

Après rectification par le prescripteur, l'ordonnance sera recevable.

2)Analyse des spécialités :

<u>DCI, dosage, forme galénique</u>	<u>Indication thérapeutique</u>	<u>Classe thérapeutique</u>	<u>Mode d'emploi</u>
Valaciclovir, 500mg, ZELITREX, comprimé	Traitement des infections herpétiques	Antiviral, inhibiteur de la transcriptase inverse Liste 1	A prendre avec un grand verre d'eau.
Aciclovir, 5%, Zovirax, crème	Traitement des infections herpétiques	Antiviral, inhibiteur de la transcriptase inverse Liste 1	En application locale sur la zone herpétique après lavage des mains
Aciclovir, 3%, Zovirax, pommade ophtalmique	Traitement des infections herpétiques	Antiviral, inhibiteur de la transcriptase inverse Liste 1	En application locale sur la zone herpétique après lavage des yeux et des mains.

3)Analyse globale :

3.1) But thérapeutique :

Cette ordonnance traite un patient souffrant d'un herpès ophtalmique et péri-ophtalmique

3.2) Associations bénéfiques :

Association de trois traitements antiviraux à visé locale et générale.

3.2) Interactions médicamenteuses :

Après contrôle et analyse de l'ordonnance, toutes les posologies sont correctes, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ni contre-indication absolue.

A noter que l'aciclovir pommade ophtalmique ne se fait plus sans substitution possible

3.3) Conclusion :

Cette ordonnance ne comporte pas d'erreur majeure.

3.4) Délivrance :

Valaciclovir 500mg, 1 boîte de 10 comprimés.

Aciclovir 5%, 1 tube de 10g

Aciclovir 3%, 1 tube de 4,5g

4)Formalité + facturation :

Pour le valaciclovir, l'aciclovir 5%, l'aciclovir 3%, je note posologie et mode d'emploi sur les conditionnements.

5)Conseils :

5.1) Pathologies :

Herpès :

- Eviter l'auto contamination par le lavage des mains et en faisant attention aux yeux (frottement et lentilles) et le grattage des lésions.
- Lutter contre la contagion dès les prodromes en évitant d'embrasser, le contact chez les personnes fragiles.
- Faciliter la cicatrisation en utilisant rapidement de crèmes avec de l'ACV

Pas de maquillage

Jeter le maquillage ancien s'il y a eu une utilisation.

Pas de prise d'AINS.

Pas de grattage

Pas d'application de crème avec des corticoïdes car risque de flambée.

-Prévenir les récurrences en reconnaissant les signes annonciateurs, attention aux expositions au soleil et en réduisant le stress et la fatigue.

-Port de lunettes de soleil pour les herpès ophtalmique

-Utilisation de l'huile essentielle de Ravintsara ou Tea Tree

-Homéopathie avec Vaccinotoxinum 9ch 1 dose dès les premiers symptômes et Rhus Tox 15 ch 5 granules toutes les deux heures.

5.2) Conseil médicaments :

Valaciclovir : A prendre à heure régulière toutes les 12 heures pour le maintien de la charge antivirale.

Pas d'obligation de prise alimentaire.

Aciclovir 5% Crème : Nettoyage et séchage de la zone à traiter. Application locale en couche mince.

Une noisette de crème.

Nettoyage des mains après utilisation.

Aciclovir 3% Pommade Ophtalmique: Nettoyage de la zone à traiter avec du sérum physiologique. Application locale en couche mince.

Une noisette de crème.

Nettoyage des mains après utilisation.

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mme Monique LEHAUT

ESCITALOPRAM BIOGARAN 5 mg cp pellic

1 comprimé le matin pendant 3 mois

NEO-MERCAZOLE 5 mg cp

2 comprimés par jour pendant 3 mois

COLECALCIFEROL 100 000UI/2ml sol buv (UVEDOSE 100 000 UI S buv Amp/2ml)

1 ampoule tous les 3 mois

Signature du médecin

Nombre de produits :3

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque la mention France, le +33 et la date de naissance du patient (ou son âge)

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, dci	liste	Classe pharmaco	indications	Mode emploi
Escitalopram 5mg en comprimés Seroplex 5mg en comprimés	Liste 1	Inhibiteur sélectif de la recapture à la sérotonine	antidépresseur	Avec un verre d'eau
Neo-mercazole 5mg en comprimés Carbimazole 5mg en comprimés	Liste 1	Dérivé imidazolé soufré	Traitement de l'hyperthyroïdie	2cp en une prise, au repas, Avaler les comprimés sans les croquer
Cholecalciferol 100 000 UI/2ml Ampoule buvable Uvedose 100 000 UI/2ml Ampoule	Liste 2	Vitamine D	Traitement des carences en vitamines D (importante pour la solidité des os notamment)	Prendre pur, diluer dans un jus de fruits ou sur une tartine de beurre

buvable				
---------	--	--	--	--

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patient souffre de dépression légère ainsi que d'hyperthyroïdie.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni associations bénéfiques, ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

DELIVRANCE :

Escitalopram 5mg → 1 boite de 28 comprimés à renouveler 2 fois

Neo-mercazole 5mg → 2 boites de 50 comprimés à renouveler 1 fois

Cholecalciferol 100 000 UI/2ml → 1 ampoule à renouveler 2 fois

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit du Neo-mercazole 5mg , de l'Escitalopram 5mg et de cholecalciferol 100 000 UI/2ml.

CONSEILS AU PATIENT :

Depression → pratiquer du yoga, éviter les sources de stress, sortir s'aérer la tête régulièrement, faire une pause dans le quotidien pour faire quelque chose que vous aimez (lire, courir, chanter ...)

Hyperthyroïdie → veillez à avoir un bon apport en calcium, avoir des bonnes nuits de sommeil, éviter les aliments iodés et très salés, consommer la caféine avec modération

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mme Evelyne RENOIR

61 Ans

SERTRALINE (chlorhydrate) 25 mg gél

(SERTRALINE EG 25 mg gél)

Prendre 1 gélule par jour, pendant 1 mois

ESOMEPRAZOLE (magnésium) 40 mg cp gastrorésis

(ESOMEPRAZOLE EG LABO 40 mg cp gastrorésis)

Prendre 1 comprimé par jour, pendant 1 mois

Signature du médecin

Nombre de produits :2

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque la mention France, le numero rpps et le + 33.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, dc	Liste	Classe pharmaco	indications	Mode emploi
Sertraline 25mg Gélule Zoloft 25mg Gélule	Liste 1	Inhibiteur sélectif de la recapture à la sérotonine	Antidépresseur	
Esomeprazole 40mg comprimés Inexium 40mg Comprimés	Liste 2	Inhibiteur de la pompe à protons	Anti-ulcère gastroduodéal Troubles de l'acidité gastrique	

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patient souffre de dépression et de troubles de l'acidité gastrique.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni associations bénéfiques, ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

DELIVRANCE :

Sertraline 25mg → 1 boite de 28 gélules

Esomeprazole 40mg → 1 boite de 28 comprimés

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit de la sertraline 25mg

CONSEILS AU PATIENT :

Depression → pratiquer du yoga, éviter les sources de stress, sortir s'aérer la tête régulièrement, faire une pause dans le quotidien pour faire quelque chose que vous aimez (lire, courir, chanter ...)

Acidité gastrique → diminuer le stress, diminuer la caféine, diminuer le tabac, éviter les aliments acides

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

ZOLMITRIPTAN 2,5 mg cp orodispers (ZOMIGORO 2,5 mg Cpr orodisp 1Plq/12)

1 cp si migraine AR au bout de 2 heures si les douleurs ne sont pas assez soulagées
AR 2 fois

CAFEINE 50 mg + PARACETAMOL 500 mg cp efferv (CLARADOL CAFEINE
500mg/50 mg Cpr eff Film/2*8 (16))

2 comprimés (voie orale) 3 fois par jour 2 boites AR 2 fois

FLUBENDAZOLE 100mg cp (FLUVERMAL Cpr Plq/6)

1 comprimé (voie orale) le matin AR dans 3 semaines

Signature du médecin

Nombre de produits :3

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque la mention France, l'adresse mail du prescripteur et le +33.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, dci	liste	Classe pharmaco	indications	Mode emploi
Zomigoro 2,5mg comprimés orodispersibles Zolmitriptan 2,5mg en comprimés orodispersibles	Liste 1	Triptans	Traitement de crise de la migraine	Laisser ce dissoudre dans la bouche puis boire un verre d'eau
Claradol caféine 500mg/50mg comprimés Paracétamol 500mg + caféine 50mg comprimés	Sans liste	Antalgique non opioïde	Traitement de la fièvre et des douleurs d'intensité modéré à sévère	Max 2 par prise Max 6 par 24h Respecter un délai de 6h entre chaque prise
Fluvermal 100mg en comprimés Flubendazole	Sans liste	antiparasitaire	Traitement curatif ou préventif des vers	1 comprimé à renouveler dans 3 semaines

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patient souffre de crise de migraine ainsi qu'éventuellement de vers (traitement préventif)

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

Associations → claradol caféine / zolmitriptan

Le claradol peut suffire à soulager certaines crises migraines peut importante tandis que le zolmitriptan est la en seconde intention quand la crise est trop forte.

DELIVRANCE :

Zolmitriptan 2,5mg → 1 boite de 12 comprimés à renouveler 2 fois

Claradol caféine 500mg/50mg → 2 boites de 16 comprimés à renouveler 2 fois

Fluvermal 100mg → 1 boite de 6 comprimés

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit du zolmitriptan 2,5mg.

CONSEILS AU PATIENT :

Migraine → éviter l'excès de caféine, garder un sommeil régulier, éliminer les sources de stress, pas d'abus d'alcool, éviter de rester dans les lieux très bruyant, éviter les odeurs trop fortes (parfum fort ...)

Vers → Bien cuire la viande, bien se laver les mains régulièrement et surtout après être allé au WC

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr NICOLAS MANGER

COAPROVEL 150 mg/12,5 mg cp pellic

1 comprimé le matin pendant 6 mois

ATORVASTATINE ACCORD 10 mg cp pellic

1 comprimé le soir pendant 6 mois

Signature du médecin

Nombre de produits :2

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque le « +33 », la mention « France », la date de naissance et l'âge du patient.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, DCI	Liste et/ou législation	Classe pharmaco	indications	Conseil de prise
Coaprovel 150mg/12,5mg Irbesartan hydrochlorothiazide 150mg/12,5mg	Liste 1	Antagoniste de l'angiotensine 2 + diurétique	Traitement de l'hypertension	De préférence le matin
Tahor 10mg Atorvastatine 10mg	Liste 1	Inhibiteur de la HMG CO-A réductase	Traitement de l'hypercholestérolémie	De préférence le soir

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical.

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patient souffre d'hypertension artérielle ainsi que d'hypercholestérolémie.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni associations bénéfiques, ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

DELIVRANCE :

Coaprovel → 1 boîte de 90 à renouveler 1 fois

Atorvastatine → 1 boîte de 90 à renouveler 1 fois

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit du coaprovel 150mg/12,5mg et de l'atorvastatine 10mg.

CONSEILS AU PATIENT :

Hypertension

- Eviter toutes sources de stress

Hypercholestérolémie

- Diminuer le sel
- Eviter les graisses animales
- Privilégiez les graisses végétales
- Eviter le stress

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

ELISE TIMIDE

4 ans – 17, 90kg

RACECADOTRIL 30 mg pdre oral sach (TIORFAN Enf)

1 sachet trois fois par jour pendant 5 jours si diarrhées

SPASFON LYOC 80 mg lyoph oral

1 lyoc deux à trois fois par jour pendant 4 jours si douleurs abdominales

PARACETAMOL 300 mg pdre p sol buv sach (DOLIPRANE)

1 sachet trois fois par jour si douleurs et/ou fièvre pendant 4 jours

Signature du médecin

Nombre de produits :3

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque le « +33 », la mention « France », la date de naissance du patient.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, DCI	Liste et/ou législation	Classe pharmaco	indications	Conseil de prise
Tiorfan 30mg Racecadotril 30mg poudre oral en sachet	Liste 1	Anti diarrhéique	Traitement de la diarrhée	Si diarrhées
Spasfon lyoc 80mg Phloroglucinol 80mg lyophylisat oral	Sans liste	Antispasmodique	Traitement des douleurs abdominales	Si douleurs abdominales
Doliprane 300mg Paracétamol 300mg	Sans liste	Antalgique et Antipyrétique	Traitement de la fièvre et des douleurs légères à modérés	Toute les 6h si fièvre ou douleurs

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical.

BUT THERAPEUTIQUE :

Ma patiente souffre de douleurs abdominales ainsi que diarrhées et éventuellement de fièvre.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

Le paracétamol et le spasfon vont tous les deux agir sur la douleur.

DELIVRANCE :

Tiorfan 30mg → 1 boite

Spasfonlyoc 80mg → 2 boites

Doliprane 300mg → 1 boite

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit du tiorfan 30mg.

CONSEILS AU PATIENT :

Diarrhée

- bien s'hydrater
- manger des fibres et des féculents (carottes, riz, pâtes)
- évitez les légumes verts

Fièvre

- ne pas trop se couvrir
- bien s'hydrater
- dormir dans une pièce tempérée (environ 19°C)

Douleurs abdominales

- utiliser une bouillotte ou une poche chaude

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mme Germaine FICHUE

ALD

SELEXID 200 mg cp pellic

2 comprimés matin et 2 comprimés le soir pendant 7 jours.

Signature du médecin

Nombre de produits :1

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque le « +33 », la mention « France », la date de naissance et l'âge du patient.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, DCI	Liste et/ou législation	Classe pharmaco	indications	Conseil de prise
Selexid 200mg	Liste 1	Antibiotique de la famille des bêtalactamines	traitement d'une infection bactérienne	En mangeant

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical.

BUT THERAPEUTIQUE :

Ma patiente souffre d'une infection bactérienne. (poser la question à la patiente pour en savoir plus) (surement une cystite)

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni associations bénéfiques, ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

DELIVRANCE :

Selexid 200mg → 1 boîte de 28 cp

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit du selexid 200mg.

CONSEILS AU PATIENT :

Cystite

- Boire régulièrement
- Ne pas se retenir d'aller uriner
- Eviter la position assise de façon prolongée
- Faire une toilette intime avec un produit pH neutre de type « saforelle, hydralin ...)

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr Oliver BOIVE

AMOXICILLINE 1 G

1 comprimé le matin midi et soir pendant 5 jours

Signature du médecin

Nombre de produits :1

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque le « +33 », la mention « France », la date de naissance du patient.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, DCI	Liste et/ou législation	Classe pharmaco	indications	Conseil de prise
Amoxicilline 1g En comprimés	Liste 1	Antibiotique de la famille des penicillines	Traitement des infections (large spectre)	1 comprimé 3 fois par jour

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical.

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patiente souffre d'une infection bactérienne nécessitant un antibiotique (à déterminer en posant des questions aux patients) .

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni interaction médicamenteuses, ni posologie anormale, ni association.

Attention aux allergies au penicillines

DELIVRANCE :

Amoxicilline 1g → 3 boîtes de 6 comprimés

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit du tiorfan 100mg.

CONSEILS AU PATIENT :

Antibiotique → prendre au milieu du repas , ne pas prendre en auto médicaments

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mme Morgane MIGNONNE

DOXY 100 mg cp pellic

1 comprimé matin et soir pendant 7 jours

Signature du médecin

Nombre de produits :1

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque le « +33 », la mention « France », la date de naissance du patient.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, DCI	Liste et/ou législation	Classe pharmaco	indications	Conseil de prise
DOXY 100MG DOXYCYCLINE	Liste 1	Antibiotique de la famille des cyclines	Traitement des infections (souvent prescrit pour l'acné)	Attention exposition au soleil Ne pas se coucher dans l'heure qui suit la prise

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical.

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patiente souffre d'une infection bactérienne nécessitant un antibiotique (à déterminer en posant des questions aux patients).

Acné → minimum 1 mois de traitement

Infection genitale de la femme → traitement de courte durée

Uretrite masculine ...

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni interaction médicamenteuses, ni posologie anormale, ni association.

DELIVRANCE :

Doxycycline 100mg → 1 boite de 15 comprimés

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit du tiorfan 100mg.

CONSEILS AU PATIENT :

Antibiotique → prendre au milieu du repas , ne pas prendre en auto médications , ne pas s'exposer au soleil, ne pas s'allonger dans l'heure suivant la prise

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr Xavier RIDULE

TIORFAN 100mg gél

1 gélule matin, midi et soir

SMECTA 3g pdre p susp buv en sachet fraise

2 sachets à 10h 16h et au coucher

Signature du médecin

Nombre de produits :2

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque le « +33 », la mention « France », la date de naissance du patient.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, DCI	Liste et/ou législation	Classe pharmaco	indications	Conseil de prise
Tiorfan 100mg Racecadotril 100mg en gélules	Liste 1	Anti diarrhéique	Traitement de la diarrhée	Une gélule avant chaque repas pendant la durée des diarrhées
Smecta 3g poudre en sachet fraise	Sans liste	Pansement gastro-intestinal	Traitement de la diarrhée	Pendant la durée des diarrhées

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical.

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patiente souffre de diarrhées chroniques.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Le tiorfan va traiter la cause de la diarrhée tandis que le smecta, par son côté argileux va absorber l'eau des selles et permettre à celles-ci de retrouver une consistance correcte.

Il n'y a ni interaction médicamenteuses, ni posologie anormale.

DELIVRANCE :

Tiorfan 100mg → 1 boîte

Smecta 3g → 1 boîte

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit du tiorfan 100mg.

CONSEILS AU PATIENT :

Diarrhée

- bien s'hydrater
- manger des fibres et des féculents (carottes, riz, pâtes)
- évitez les légumes verts

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mme Christiane ROULANTE

Piroxicam 20mg cp

(BREXIN 20mg Cpr séc Plq/14)

Renouveler 1 fois

Prendre 1 comprimé par jour, au cours du repas pendant 3 mois.

Signature du médecin

Nombre de produits :1

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque le « +33 », la mention France et la date de naissance de la patiente.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, DCI	Liste et/ou législation	Classe pharmaco	indications	Conseil de prise
Brexin 20mg Pirocam 20mg En comprimés	Liste 1	Anti inflammatoire non stéroïdien	Traitement des inflammations rhumatologique	En mangeant

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical.

BUT THERAPEUTIQUE :

Ma patiente souffre d'une inflammation a précisé en posant des questions à la patiente.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni associations, ni contre indication, ni interaction médicamenteuse, ni posologie anormale.

DELIVRANCE :

Brexin 20mg → 1 boîte de 14 à renouveler une fois

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit de le brexin 20mg

CONSEILS AU PATIENT :

Prendre en mangeant

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr Alain BACIN

ACIDE ACETYLSAICYLIQUE (sel de lysine)75mg pdre p sol buv sach (KARDEGIC)

1 sachet le midi lors du repas pendant 3 mois

BISOPROLOL FUMARATE 5mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25 mg cp (LODOZ)

1 comprimé le matin pendant 3 mois

Zymad 80000U 1 ampoule

Signature du médecin

Nombre de produits :3

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque le « +33 », la mention France et la date de naissance et l'âge du patient.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, DCI	Liste et/ou législation	Classe pharmaco	indications	Conseil de prise
Kardegic 75mg Acide acétylsalicylique 75mg	Sans liste	Antiagrégant plaquettaire	anti thrombotiques	
Bisoprolol 5mg hydrochlorothiazide 6.25mg Lodoz 5mg/6.25mg	Liste 1	Beta bloquant + diurétique	Traitement de l'hypertension artérielle	Prendre le matin
Zyma D 80 000 ui/2ml Cholecalciferol 80 000 ui/2ml	Liste 2	Vitamine D	Traitement des carences en vitamine D et prévention des maladies osseuses	Prendre pur ou diluer dans un corps gras

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical.

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patient souffre d'hypertension artérielle ainsi que de risque thrombotique (infarctus du myocarde, ...).

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni contre indication, ni interaction médicamenteuse, ni posologie anormale.

Bisoprolol + hydrochlorothiazide (bithérapie de l'hypertension artérielle)

DELIVRANCE :

Kardegic 75mg → 1 boîte de 30 sachet à renouveler 2 fois

Bisoprolol hydrochlorothiazide 5mg/6.25mg → 1 boîte de 90 comprimés

Zyma D → 1 ampoule

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit de le bisoprolol hydrochlorothiazide et le zyma D.

CONSEILS AU PATIENT :

Hypertension artérielle

- Eviter toutes sources de stress

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mme Nicolette BARY

LORAZEPAM 1 mg cp (TEMESTA 1mg Cpr séc Plq/30)

1 comprimé (voie orale) le soir pendant 1 mois

Signature du médecin

Nombre de produits :1

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque le « +33 », la mention France, le numéro finess

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, DCI	Liste et/ou législation	Classe pharmaco	indications	Conseil de prise
Lorazepam 1mg Temesta 1mg En comprimés	Liste 1	Anxiolytique de la famille des benzodiazépines	Traitement symptomatique des états anxieux sévère Traitement du delirium dus au sevrage alcoolique	1 comprimé le soir

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical.

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patiente souffre d'un état anxieux sévère.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni associations, ni posologie anormale.

Attention avec les opioïde, les barbituriques, le buprénorphine et les dérivés morphinique car risque de dépression respiratoire.

DELIVRANCE :

Temesta 1mg → 1 boîte de 30

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit de le temesta 1mg

CONSEILS AU PATIENT :

Anxiété →

Stimuler notre odorat :

l'Ylang-Ylang)

- Les huiles essentielles (la lavande, l'eucalyptus,

- L'encens (le Santal ou la cannelle)

Ce changer les idées et ce faire plaisir

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr Robert ENOULE

INNOVAIR NEXTHALER 100ug

2 inhalations (voie inhalée) 2 fois par jour pendant 6 mois

MONTELUKAST (sel de na) 10mg cp (MONTELUKAST ZYDUS)

1 comprimé (voie orale) le soir pendant 6 mois

SALBUTAMOL (sulfate) 100ug susp p inh en fl press (VENTOLINE)

1 flacon AR 2 fois

COLECALCIFEROL 100000 UI/2ml sol buv (UVEDOSE)

1 ampoule en Janvier Mars et Mai 2021

Signature du médecin

Nombre de produits :4

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque la mention France, la date de naissance du patient et le + 33.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, dci	Liste	Classe pharmaco	indications	Mode emploi
Innovair nexthaler 100ug Beclometasone dipropionate 100 ug / dose + formotérol fumarate 6ug/dose Poudre pour inhalation	Liste 1	Corticoïde + bronchodilatateur	Traitement de fond de l'asthme	Rincez-vous la bouche après emploi
Montelukast 10mg Singulair 10mg En comprimés	Liste 1	antileucotriene	Traitement de fond de l'asthme resistant	
Salbutamol 100ug Ventoline 100ug	Liste 1	Béta 2 stimulant d'action brève	Traitement de crise d'asthme	Utiliser uniquement en cas de crise

Suspension pour inhalation				
Cholecalciferol 100 000 ui/2ml	Liste 2	Vitamine D	Traitement des carences en vitamines D ou prévention des maladies osseuse (ostéoporose...)	Prendre pur ou diluer dans un corps gras
Uvedose 100 000ui/2ml				
En ampoule				

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patient souffre de crise d'asthme .

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

Association → innovair + montelukast = bithérapie en traitement de fond de l'asthme

→ Innovair + montelukast + ventoline = traitement de crise et traitement de fond de l'asthme

DELIVRANCE :

Innovair 100ug/6ug → 1 flacon de 120 doses à renouveler 5 fois

Montelukast 10mg → 1 boîte de 28 comprimés à renouveler 5 fois

Salbutamol 100ug → 1 flacon à renouveler 2 fois

Uvedose 100 000 ui/2ml → 1 ampoule à renouveler 2 fois

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit de l'innovair 100ug/6ug, montelukast 10mg, salbutamol 100ug et uvedose 100 000 ui/2ml

CONSEILS AU PATIENT :

Asthme → éviter les lieux enfumés, arrêt du tabagisme, nettoyer régulièrement les pièces, aérer régulièrement les pièces, privilégier les oreillers et les couettes en matières synthétiques, toujours avoir sur soi le traitement de crise et une ordonnance valide en cas de besoin, éviter les sources allergiques (si asthme allergique)...

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mme Monique LEHAUT

DIPROSONE 0,05% crème

1 application par jour 1 mois

Uvédose 1 boîte

Signature du médecin

Nombre de produits :2

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque la mention France, le +33, la date de naissance du patient, le sexe du patient.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, dci	Liste	Classe pharmaco	indications	Mode emploi
Diprosone 0.05% En crème betamethasone	Liste 1	Dermocorticoïde Préparation dermatologiques	Traitement du psoriasis et autres irritations cutanées	Application sur peau propre et sèche Ce laver les mains après sauf s'il s'agit de la zone à traiter
Uvedose Cholecalciferol 100 000 ui/2ml En ampoule	Liste 2	Vitamine D	Traitement des carences en vitamines D et prévention des maladies osseuses ...	Prendre pur ou diluer dans un corps gras

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patient souffre d'une irritation de la peau nécessitant un traitement local.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni associations bénéfiques, ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

DELIVRANCE :

Diprosone 0.05% creme → (en fonction de la surface à traiter (plus ou moins importante))
souvent 1 tube à renouveler

Uvedose 100 000 ui/2ml → 1 ampoule

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit du diprosone 0.05% et uvedose 100 000 ui/2ml.

CONSEILS AU PATIENT :

Psoriasis → Ne pas gratter

Ne vous exposez pas au soleil sans une protection solaire efficace.

Apprenez à gérer votre stress.

Après la douche ou le bain, séchez-vous bien en tamponnant votre peau avec une serviette.

Modérez les viandes et les produits laitiers car leurs acides gras favorisent le processus inflammatoire.

Ne portez pas de vêtements trop serrés et préférez ceux en coton ou en lin aux matières synthétiques.

Évitez les produits de toilette irritants, comme ceux contenant de l'alcool notamment

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Mr Didier MANNEVILLET

AUGMENTIN 1g

1 sachet matin midi et soir pendant 7 jours.

FUCIDINE crème

1 application matin et soir sur le cuir chevelu pendant 7 jours.

Signature du médecin

Nombre de produits :2

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque le « +33 », l'adresse complete du prescripteur .

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, DCI	Liste et/ou législation	Classe pharmaco	indications	Conseil de prise
Augmentin 1g Amoxicilline 1g / acide clavulanique 125mg En sachet	Liste 1	Antibiotique de la famille des penicillines Inhibiteur des beta lactamases	Traitement des infections (large spectre)	1 sachet 3 fois par jour Au repas
Fucidine crème	Liste 1	Antibiotique à usage topique	Traitement des infections de la peau (furoncles, ongles incarnés...)	Appliquer en couche fine Bien se laver les mains après utilisation

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical.

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patiente souffre d'une infection bactérienne cutanée au niveau du cuir chevelu nécessitant une association d'antibiotiques

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni interaction médicamenteuses, ni posologie anormale.

Attention aux allergies au penicillines

Association → amoxicilline / acide clavulanique (l'acide clavulanique va protéger la penicilline de la destruction par les betalactases , et donc permettre à celui-ci de pouvoir agir en totalité)

Augmentin et fucidine (traitement par action locale et par action systémique)

DELIVRANCE :

Augmentin 1g → 2 boites de 12 sachets

Fucidine crème → 1 tube (voir un deuxième si grosse surface à traiter)

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit de l'amoxicilline 1 g et la fucidine.

CONSEILS AU PATIENT :

Antibiotique → prendre au milieu du repas, ne pas prendre en auto médications

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Julie BELLE

06 Juin 1981 (39 ans)

CLAREAL 1 AN

1/J

ULIPRISTAL ACETATE 30mg cp (ELLAONE)

A prendre en cas de rapport sexuel dans les 5 jours précédent un oubli de pilule de plus de 12 heures.

EDEN préservatif fin latex lubrifié

12 Préservatifs.

Signature du médecin

Nombre de produits :3

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque la mention France et le +33.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, dci	Liste	Classe pharmaco	indications	Mode emploi
Clareal (desogestrel) Cerazette Comprimé pelliculé	Liste 1	Contraceptif hormonal à usage systemique (progestatif seul)	Moyen de contraception hormonal	A prendre tout les jours à la même heure
Ellaone 30mg Ulipristal 30mg Comprimé pelliculé	Sans liste	Contraception hormonale d'urgence	« Pilule dulendemain »	A prendre dans les 5 jours en cas de rapport sexuel non protégé avec un oublie de pilule de + de 12h

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Eden préservatifs → préservatifs masculins en latex remboursés sur prescription médicale

Il s'agit d'un moyen de contraception non hormonal ainsi que d'un moyen de prévention des IST

BUT THERAPEUTIQUE :

Ma patiente à consulté pour avoir une prescription d'un moyen de contraception.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

Associations → clareal et eden (association de 2 moyen de contraceptions)

DELIVRANCE :

Clareal → 1 boite de 84 comprimés à renouveler 3 fois

Ellaone → 1 boite

Eden → 1 boite à renouveler à la demande pendant 1 an

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit du clareal.

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Bruno CEINTURE

ESOMEPRAZOLE 20MG ARROW CPR 28 (Esomeprazole)

1 comprimé par jour.

GAVISCON SUSP BUV SACHET 10ML 24

1 sachet 1 à 2 fois par jour.

Signature du médecin

Nombre de produits :

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque la spécialité du prescripteur, la mention France, le numéro de téléphone contenant le +33, la date de naissance du patient et son âge... (+ il s'agit d'un duplicata)

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, dci	liste	Classe pharmaco	indications	Mode emploi
Esomeprazole 20mg Inexium 20mg En comprimé	Liste 2	Inhibiteur de la pompe à protons	Prévention des ulcères gastro duodénales Troubles de l'acidité gastrique	
Gaviscon Alginate et bicarbonate de sodium En sachet dose	Sans liste	Antiacide	Traitement symptomatique des reflux gastro œsophagien	Après les repas A distance des autres médicaments

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patient souffre de reflux gastro-œsophagiens.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

Associations → gaviscon et esomeprazole (le gaviscon va être un traitement symptomatique tandis que l'esomeprazole va agir sur la cause des reflux)

DELIVRANCE :

Gaviscon → 1 boîte de 24 sachets

Esomeprazole 20mg → 1 boîte de 7 comprimés

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit de l'esomeprazole 20mg.

CONSEILS AU PATIENT :

Reflux gastro oesophagien → fractionnez les repas et évitez d'en prendre de trop copieux, identifiez les aliments qui favorisent vos brûlures, ne vous couchez pas immédiatement après le dîner, surélevez la tête de votre lit et dormez sur le dos ...

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Patrice JACK

Permixon 160mg

- Une gélule matin et soir

Alfuzozine LP 10mg

- Un cp le soir

Ordonnance à renouveler pendant 6 mois.

Signature du médecin

Nombre de produits :

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque la mention France, le +33 ,la date de naissance du patient et son âge.

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, dci	Liste	Classe pharmaco	indications	Mode emploi
Permixon 160mg Palmier de floride 160mg En gélule	Sans liste	Traitement phytothérapeutique	Indiquer dans les cas d'hypertrophie bénigne de la prostate	Au repas
Alfuzosine LP 10mg Xatral LP 10mg En comprimé à libération prolongé	Liste 1	Alpha bloquant	Indiquer en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate	

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patient souffre d'une hypertrophie bénigne de la prostate.

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

Association → bithérapie contre l'hypertrophie bénigne de la prostate (permixon et alfuzosine)

DELIVRANCE :

Permixon 160mg → 1 boîte de 180 gélules à renouveler 1 fois

Alfuzosine LP 10mg → 1 boîte de 30 comprimés à libération prolongés à renouveler 5 fois

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il s'agit de l'alfuzosine LP 10mg.

CONSEILS AU PATIENT :

Bien vider sa vessie à chaque miction, avoir un suivi régulier par un professionnel de santé (médecin, urologue)

Cabinet du Prestige, Place de la Tour de guet, 76000 Rouen Tel :02.35.95.17.42.

En cas d'urgence, composez le 15

Dr Francis Léger

MEDECINE GENERALE

Conventionné Secteur 1

Consultation sur rendez-vous

Du lundi au Samedi

N°AM :760112461

N°RPPS :1010213187

Rouen (Date du jour)

Louise AUBRA

TETRAVAC-ACELLULAIRE susp inj en seringue préremplie.

Signature du médecin

Nombre de produits :1

RECEVABILITE :

L'ordonnance n'est pas recevable, il manque la mention France, contenant le +33, la date de naissance du patient et son âge...

ANALYSE DES SPECIALITES :

Nom, dosage, dci	liste	Classe pharmaco	indications	Mode emploi
Tetravac acellulaire Suspension injectable en seringuepréremplie	Sans liste	Vaccin inactivé	Traitement préventif de la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite	en primo vaccination chez les nourrissons à partir de l'âge de 2 mois en rappel à l'âge de 11 mois en rappel à l'âge de 6 ans en rappel entre 11 et 13 ans pour les enfants n'ayant pas reçu à l'âge de 6 ans de vaccin comportant la valence coquelucheuse à concentration normale conservation au frigo

DISPOSITIFS MEDICAUX :

Il n'y a pas de dispositif médical

BUT THERAPEUTIQUE :

Mon patient va ce faire vacciner contre la coqueluche, le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite. (on ne sais pas l'âge du patient donc on ne sais pas s'il s'agit d'un rappel ou non)

ASSOCIATIONS BENEFIQUES, I.M., C.I., POSOLOGIE ANORMALE :

Il n'y a ni association, ni interactions médicamenteuse, ni contre indication, ni posologie anormale.

DELIVRANCE :

Tetravac acellulaire → 1 boîte

FORMALITES de DELIVRANCE :

Je note sur les produits listés la posologie et le mode d'emploi, dans cette ordonnance il n'y en a pas.